

УДК 636.12

## ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШЕТЛЕНДСКИХ ПОНИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

*Миронова Т.А., ассистент кафедры Животноводства  
Калининградский филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный  
университет», Калининград, Россия*

**Ключевые слова:** *пони, шетлендские пони, экстерьер, промеры, пони спорт, конный спорт, племенная работа.*

*В работе дается характеристика экстерьера поголовья шетлендских пони на территории Калининградской области по основным промерам – высота в холке, обхват в груди, косая длина и обхват пясти, также проводится анализ полученных данных со стандартом породы.*

**Введение.** В настоящее время во всем мире активно развивается конный спорт, увеличивается количество различных соревнований международного уровня, проводимых в стране, в их числе этапы Кубка Мира, повышаются их результаты, возрастает уровень мастерства спортсменов. Соответственно растут требования к работоспособности лошадей, а перед селекционерами стоит задача по совершенствованию качеств лошадей, используемых в конном спорте [1]. Также на фоне активно развивающегося взрослого конного спорта стал набирать популярность пони-спорт или конный спорт для детей и подростков, которые уже с ранних лет учатся держаться в седле и выступать на соревнованиях, тут на первое место выходит подбор соответствующих пород пони, отличающихся рядом характеристик – выносливость, неприхотливость и спокойный темперамент.

**Целью** нашей работы является изучение показателей экстерьера и конституции поголовья шетлендских пони на территории Калининградской области, с возможностью дальнейшего использования полученных данных для анализа потенциала пони-спорта в регионе.

**Материал и методика исследований:** материалом послужило поголовье шетлендских пони двух предприятий Калининградской об-

ласти - ЛПХ Кобизь «Конек-горбунок» в пос. Шолохово Полесского района и Агротуристическая ферма «Кони-пони двор» в пос. Беломорское того же района. Всего было исследовано 10 голов пони, все имеют подтверждённое происхождение. Стоит также отметить, что в ЛПХ Кобизь «Конек-горбунок» пони польской селекции, привезенные в Калининградскую область в 2014 году из племенного хозяйства «Hodowla Kucy Szetlandzkich - Konik Tarantowaty» в г.Боболице Польша. Поголовье же Агротуристической фермы «Кони-пони двор» было приобретено у местного конно-спортивного клуба и ведет свое происхождение из Прилепского конного завода.

Оценка экстерьера пони проводилась по общепринятым методикам. Для взятия промеров использовалась мерная палка и измерительная лента [2,3]. Измерения делались утром до кормления животных.

**Результаты исследования.** При оценке экстерьерных показателей мы учитывали и половозрастные показатели, по полу исследуемая группа разделилась следующим образом: 5 жеребцов и 5 кобыл, по возрасту – имеется широкий разброс, так наименьший возраст 3 года, а наибольший 14 лет, при расчете среднего возраста по поголовью было получено следующее значение 8,3 года.

Оценка полученных данных по промерам, позволила выделить среди поголовья представителей двух классов-типов Шетландских пони : класс А или базовый тип, к которому относят животных высотой в холке до 107 см, и класс Б или улучшенный тип, высота в холке этих животных колеблется от 107 до 120 см, однако в таблице 1 нами представлены средние показатели промеров исследуемого поголовья [4].

По данным таблицы можно увидеть, что по высоте в холке кобылы преобладают над жеребцами на 3,9%, где кобылы - 109,2±11,2 см, жеребцы - 105,1±4,3 см, что в принципе не характерно для крупных

**Таблица 1 – Средние показатели промеров поголовья, в см**

| Показатели    | n  | Высота в холке         | Обхват груди           | Косая длина            | Обхват пясти           |
|---------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Группа        |    | $\bar{X} \pm m\bar{x}$ | $\bar{X} \pm m\bar{x}$ | $\bar{X} \pm m\bar{x}$ | $\bar{X} \pm m\bar{x}$ |
| Жеребцы       | 5  | 105,1±4,3              | 124,4±5,7              | 118,0±4,5              | 15±1,3                 |
| Кобылы        | 5  | 109,2±11,2             | 130,0±8,8              | 121,5±4,2              | 14,8±2,6               |
| Все поголовье | 10 | 107,8±7,8              | 127,3±8,2              | 120,4±3,8              | 15±1,3                 |

млекопитающих с половым деморфизмом. Так наибольшая высота в холке среди исследуемых животных была также отмечена у кобылы из стада ЛПХ Кобизь «Конек-горбунок» и составляла 120 см.

Показатель обхвата груди является одним из характеризующих развитость грудной клетки и дыхательной системы, у кобыл он составил  $130,0 \pm 8,8$  см, что на 4,5% больше чем у жеребцов -  $124,4 \pm 5,7$  см.

Косая длина туловища входит в расчет ряда индексов телосложения, но прежде всего, характеризует степень растянутости или длину корпуса животного. Данный показатель, ожидаемо, оказался больше у кобыл  $121,5 \pm 4,2$  см, на 2,9%, чем у жеребцов -  $118,0 \pm 4,5$  см. Данные по обхвату пясти не выявили существенных различий и составили  $15 \pm 1,3$  см и  $14,8 \pm 2,6$  см у жеребцов и кобыл соответственно.

Полученные средние показатели по всему поголовью мы сравнили со стандартом породы шетлендских пони, где высота в холке – 105,0 см; обхват в груди – 138,5 см; обхват пясти – 15,0 см [5,6]. При анализе полученных данных, можно говорить, что поголовье исследуемых животных крупнее стандарта породы по высоте в холке на 2,6%, но по обхвату груди уступают стандарту на 8,8%, особенно сильно это отмечается у жеребцов, по обхвату пясти можно сказать, что имеется полное совпадение с породой.

**Закключение:** в ходе исследования нами было оценено поголовье шетлендских пони двух предприятий Калининградской области, так оценивались основные показатели экстерьера – высота в холке, обхват груди, косая длина туловища и обхват пясти. По полученным данным, можно сделать выводы об экстерьерно-конституциональном развитии представителей данной породы в регионе, так отмечается, что по высоте в холке, обхвату в груди и косой длине туловища кобылы преобладают над жеребцами. При сравнительном анализе полученных данных со стандартом породы отмечается не соответствие по высоте в холке, обхвату в груди и косой длине туловища, что может послужить началу проведения планомерной племенной работы среди данного поголовья.

#### *Библиографический список:*

1. Алексеева, Е. И. Поддержка коневодства на Северо-Западе России // Коневодство и конный спорт. – 2013. - №1. – С. 3 – 4.
2. Инструкция по бонитировке племенных лошадей заводских пород. - М., 1991. - 31 с.

3. Калашников В.В., Соколов Ю.А., Пустовой В.Ф. Практическое коневодство. – М.: Колос, 2000. – 376 с.
4. Дубровская Е.Б. Биологическая и зоотехническая характеристика шетлендских пони и перспективы их разведения в России: автореф. дисс. на соиск. степ. канд. с-х. наук.-ВНИИК- 1996.- 17 с.
5. Козлов С.А., Парфёнов В.А. Коневодство. Учебник для ВУЗов. – СПб: Лань, 2004. – 520с.
6. Купцова, Н. А. Внутрипородные типы в российской популяции шетлендских пони// Коневодство и конный спорт. – 2015. - №3. – С. 28 – 30.

## **THE SHETLAND PONY OF THE KALININGRAD REGION EXTERIOR INDEX CHARACTERISTICS**

***Mironova T.A.***

**Keywords:** *ponies, Shetland ponies, exterior, measurements, pony sport, horse sport, breeding work.*

*The paper describes the exteriors of Shetland ponies in the Kaliningrad region in terms of basic measurements - height at the withers, girth in the chest, oblique length and girth of the pastern, and analysis of the obtained data with the breed standard.*