

УДК: 619:616-07

УШИВАНИЕ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖИ У ТИГРЕНКА

*Соболева А.А., студентка 3 курса ФВМиБ
Научный руководитель – Ермолаев В.А., д.вет.н., профессор
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ*

Ключевые слова: грыжа, кожа, брюшина, разрез, шов.

Пупочная грыжа достаточно часто встречается в ветеринарной практике. Причем она распространена не только у молодых щенков, но и у взрослых особей. Данная патология в основном носит врожденный характер, но так же может развиваться и при чрезмерной нагрузке на мышцы брюшной полости. И справиться ее можно только хирургическим путем.

В ветеринарную клинику «Dogtor» Ульяновской области, города Димитровграда, поступил тигренок в возрасте 3 месяце, кобель (рис.1). При осмотре была обнаружена врожденная пупочная грыжа. Было принято решение провести хирургическое лечение [1, 2].

Пупочной грыжей называют выпячивание брюшины и выпадение части внутренних органов через расширенное пупочное кольцо. В данном случае пупочная грыжа – это выпячивание брюшины.

Операция проводилась под общим наркозом. Подготовили операционное поле, путем выбривания шерсти, обработки кожи 70% спиртом и 5% раствором йода. В саму грыжу ввели раствор лидокаина, с че-



Рисунок - 1



Рисунок - 2



Рисунок - 3



Рисунок - 4



Рисунок - 5

тырех сторон, для местного обезболивания (рис.2).

Рассекают кожу продольным разрезом посередине грыжи. Затем отпрепарировали листок брюшины от кожи до пупочного кольца и вправили в брюшную полость (Рис.3) [3, 4, 5].

На грыжевое кольцо накладывают петлевидный или узловатый шов из рассасывающегося материала. Рекомендуют скарифицировать край грыжевого кольца, т.е. надрезать края, что бы вызвать более плотное сращение, впоследствии (рис. 4,5).

Заключительным этапом грыжесечения является наложение узловатых швов на кожу.

После операции состояние тигренка было стабильным [6, 7, 8].

Библиографический список

1. Ермолаев, В.А. Клинико-морфологическая картина кожно-мышечных ран у собак под воздействием светодиода излучения красного диапазона (СДИКД) / Ермолаев В.А., Сапожников А.В., Марьин Е.М., Ляшенко П.М., Днекешев А.К., Мурзабаев К.Е., Киреев А.К. // В сборнике: Актуальные вопросы ветеринарной науки Материалы Международной научно-практической конференции. 2015. С. 149-154.
2. Ермолаев, В.А. Морфологические показатели крови при лечении ран у собак природными сорбентами / Ермолаев В.А., Марьин Е.М. // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2006. Т. 187. С. 35-40.
3. Ермолаев, В.А. Эндоскопическая диагностика различных патологий у мелких домашних животных / Ермолаев В.А., Сапожников А.В., Марьин Е.М., Ляшенко П.М. // В сборнике: ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ Сборник трудов. 2015. С. 20-23.
4. Бобров, А.А. Курс оперативной хирургии / А.А. Бобров. - М.: А. Карцев; Издание 4-е, испр., 2006. - 582 с.
5. Шишков, В.П. Ветеринарный энциклопедический словарь / ред. Шишков, В.П. и. - М.: Советская Энциклопедия, 2006. - 640 с.
6. Карлсон, Д. Д. Домашний ветеринарный справочник для владельцев кошек / Д.Д. Карлсон, Д.М. Гиффин, Л.Д. Карлсон. - М.: Центрполиграф, 2001. - 576 с.
7. Светухин, А.А. Избранный курс лекций по гнойной хирургии / ред. В.Д. Федоров, А.А. Светухин. - М.: Миклош, 2005. - 365 с.
8. Маккракен, Т. Атлас анатомии мелких домашних животных / Т. Маккракен, Р. Кайнер. - М.: Аквариум-Принт, 2014. - 144 с.

CLOSURE OF THE UMBILICAL HERNIA IN TIGER***Soboleva AA******Key words:* hernia, skin, peritoneum incision, suture.**

Umbilical hernia often occurs in veterinary practice. Moreover, it is common not only in young puppies, but also in adults. This pathology is largely innate, but also can develop when excessive load on the muscles of the abdominal cavity. And on the right it can be only by surgery.