

УДК 619:618:636.2

ЛЕЧЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА

*Гурдова Б., студентка 1 курса факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии
Научный руководитель – Мухитов А.З., доцент, кандидат
биологических наук
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ*

Ключевые слова: *влагалище, выпадение, корова, лечение, анестезия.*

В статье сообщается о симптомах, причинах и лечении выпавшего влагалища.

Под выпадением влагалища понимают выпячивание влагалищной стенки из половой щели. Оно бывает частичным и полным. Выпадение влагалища чаще наблюдается за 1-1,5 месяца до родов и после них.

Предродовое выпадение влагалища бывает у истощенных (на почве расстройства деятельности органов пищеварения, общего заболевания или неудовлетворительного кормления) и старых коров [1,2].

Причиной выпадения влагалища является расслабление связочного аппарата тазовой полости и стенки самого влагалища. Выпадению может способствовать общая слабость животного, недостаточный рацион и содержание коров в стойлах с чрезмерно покатым полом. Послеродовое выпадение влагалища может быть вызвано бурными потугами, насильственным и быстрым (с применением большой силы) извлечением плода, а также растяжением или разрывом тканей, фиксирующих влагалище. При частичном выпадении влагалища в верхней части половой щели выпячивается блестящее красное или розовое полшаровидное тело размером с гусиное яйцо или кулак. Чаще выпячивание наблюдается у лежащей коровы. После того, как корова встанет, выпавшее влагалище обычно втягивается обратно в тазовую полость.

При полном выпадении влагалища из вульвы выступает большое шаровидное тело. В начальной стадии заболевания оно блестящее, светло-красного цвета. На конце выпавшего влагалища видно наружное отверстие шейки матки, покрытое слизью. В дальнейшем поверхность выпавшего влагалища становится отечной, сине-фиолетового цвета, с кровоточащими трещинами, корочками засохшей крови, слизи и грязи [3,4,5].

Выпавшее влагалище следует обмыть теплым слабым раствором перманганата калия (1:5000) или раствором фурацилина такой же концентрации, смазать вазелином или ихтиоловой мазью и затем вправить. Когда корова стоит, это удается сделать без большого труда, нажав кулаком на центр выпавшей части влагалища.

При наличии натуживания рекомендуется снять потуги дачей внутрь 1л алкоголя или произвести сакральную эпидуральную анестезию путем введения в эпидуральное пространство 10-15 мл 1-1,5%-ного водного раствора новокаина.

После вправления влагалища корову помещают в стойло с покатым полом (голова должна быть ниже таза). Влагалище укрепляют петлей из мягких веревок. В тяжелых случаях после вправления влагалища на верхний участок половой щели накладывают 2-3 шва из тесьмы или мягкого бинта с валиками или кisetный шов. С наступлением родов петли или швы надо снять [6].

Основной задачей при данном заболевании является удержание (укрепление) вправленного влагалища. Если потуги после вправления продолжаются, то в эпидуральное пространство повторно вводят раствор новокаина в той же дозе.

Библиографический список:

1. Шишков, Н. К. Внутренние незаразные болезни : учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Ч. 2 / Н. К. Шишков, А. З. Мухитов, Н. В. Шаронина. – Ульяновск : ГСХА, 2016. – 218 с.
2. Шишков, Н. К. Физиотерапия : учебное пособие для студентов факультета ветеринарной медицины по специальности 111801.65 «Ветеринария» / Н. К. Шишков, Н. В. Шаронина, А. З. Мухитов. – Ульяновск : ГСХА, 2015. - 124 с.
3. Шишков, Н. К. Распространение травматического ретикулита у крупного рогатого скота в некоторых хозяйствах Ульяновской области / Н. К. Шишков, Н. В. Шаронина, А. З. Мухитов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2015. - № 4. - С. 168-171.
4. Дежаткина, С. В. Обмен веществ и продуктивность животных при использовании комплексной подкормки / С. В. Дежаткина, Н. А. Любин, М. Е. Дежаткин // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2018. - № 1 (41). - С.79-85.
5. Дежаткина, С. В. Влияние препарата «Аминобиол» на молочную продуктивность коров / С. В. Дежаткина, А. З. Мухитов, Н. В. Шаронина // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2019. - №

- 2 (46). - С.179-183.
6. Силова, Н. В. Ветеринарная и клиническая фармакология. Токсикология. Разделы «Рецептура с технологией», «Общая фармакология»: учебно-методический комплекс / Н. В. Силова, В. П. Кондратьева. – Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 114 с.
 7. Дежаткина С.В. Влияние соевой окары на активность ферментов у свиноматок и поросят/ С.В. Дежаткина, А.В.Дозоров //Свиноводство. 2011. № 8. С. 28-32.

TREATMENT OF VAGINAL PROLAPSE

Gurdova B.

Key words: *vagina, prolapse, cow, treatment, anesthesia.*

The article reports on the symptoms, causes, and treatment of a fallen vagina.