

ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ

**Казакова Ю.Е., студентка 2 курса факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий
Научный руководитель – Савина Е.В., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент;
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ**

Ключевые слова: *овцы, пастбищная система, стойловое содержание, гигиена кормления.*

Данная работа посвящена рассмотрению таких вопросов как системы содержания овец, гигиена кормления и поения, гигиена содержания овцематок и содержание овец в пастбищный период.

В овцеводстве внедрены такие системы содержания как: стойловая, стойлово-пастбищная, пастбищная и пастбищно-стойловая. При стойловой системе овец зимой держат и кормят в помещении и на выгульно-кормовых дворах, только во дворах летом. Стойлово-пастбищную систему используют там, где достаточно естественных пастбищ, но условия зимой довольно жесткие. При этой системе зимой животных держат в загонах для овец, кормят из кормушек, установленных на открытых основаниях, а в дождливые дни - в помещениях [1].

Летом овец перегоняют на пастбища. При пастбищно-стойловой системе овцы пасутся на пастбищах в течение большей части года. Высокогорные пастбища используются в основном летом, а низменные - зимой. На зимних пастбищах выстраивают для проведения зимнего или ранневесеннего ягнения овчарни с тепляками, а для весеннего ягнения - без тепляков. Навесы сделаны для защиты животных в плохую погоду. Пастбищная система используется в районах, где трава предгорья является основной кормовой базой. Чтобы прокормить овец в непогоду, а овцематок – во время ягнения в таких хозяйствах на зимних пастбищах необходимо иметь страховые запасы корма не менее 20% годовой потребности [2].

Овец кормят из специальных или комбинированных кормушек, а поят - из деревянных или легких металлических лотков, автоматических поилок. Зимой грубые корма укладывают в ясли, зерновые и соль-лизунец - в кормушки. Во избежание травм при кормлении расстояние между кормовыми рядами составляет не более 3,5 м. Отруби дают в виде смеси с корнеплодами или жмыхом. Чтобы исключить засорение и воспаление преджелудков, ржаные зерна и ржаные отруби не рекомендуются для кормления овец. Важным условием поддержания нормального обмена веществ является регулярное и достаточное поение. Летом овец поят 2 раза в день: после утреннего выпаса и перед вечерним выпасом; в остальное время года - 1 раз - до возвращения с выпаса [3].

Чтобы предотвратить аборт, суягным маткам нельзя давать слежавшийся, замерзший, плесневелый или загрязнённый корм. Аналогичные требования касаются кормления овцематок и ягнят. За 3-4 недели до ягнения маток переводят во временные групповые клетки (по 15-20 голов) из переносных щитов. За неделю до родов уменьшается количество грубого корма в рационе овец, увеличивается доля концентратов и прекращается кормление силосом. Овцематок с наступающими признаками родов переводят в отдельные клетки. В первые 1-3 дня после ягнения матка получает только сено хорошего качества. Сочные корма и концентраты включают с 3-5-го дня. Их переводят на полноценный рацион на 4-5-й день после родов. У обьягнвившихся овец регулярно проверяют состояние вымени. Молочные пробки, образующиеся в сосковых протоках, удаляются частым, но коротким сжатием соска. Не позволяйте овцам лежать на снегу или холодной земле, в помещениях всегда должна лежать сухая и тёплая подстилка. Частое (через 2-3 часа) подпускание ягнят к маткам для кормления является важным фактором профилактики заболеваний мастита.

Овец выводят на пастбище весной, когда земля хорошо высыхает. Сначала овцы проводят ночь в кошарах, а когда наступает теплая и стабильная погода, их держат на пастбище круглосуточно. Сухие пастбища с небольшими растениями лучше всего подходят для овец. На влажных, болотистых пастбищах у овец часто развиваются гельминтозы и массивные повреждения копыт [4]. Овцы не могут пастись в местах с грубыми и колючими растениями, которые забивают шерсть. При выпасе овцам следует давать соль, которую помещают в неглубокие

желоба (решетки), расположенные вблизи водопоя. Зимние пастбища обычно находятся рядом с овцеводческими фермами.

Библиографический список:

1. Аристов У. Х., Виноградова В. М. «Овцеводство и козоводство» - 1990.
2. Волков Г. К., Гуцин «Гиена в промышленном овцеводстве» - 1980.
3. Зиппер А. Ф. «Содержание коз и овец» - 2006.
4. Тиунов А. П., Щукарь Г. С. «Овцеводство» - 2005.

HYGIENE OF SHEEP KEEPING

Kazakova Yu.E.

Keywords: *sheep, pasture system, stable maintenance, feeding hygiene.*

This work is devoted to the consideration of such issues as sheep keeping systems, feeding and watering hygiene, hygiene of sheep keeping and sheep keeping in the pasture period.